

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rekonsiliasi obat, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian berikut ini:

1. Prevalensi DRP potensial pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Sewon II Bantul setelah dilakukan rekonsiliasi obat adalah sebesar 77%.
2. Berdasarkan hasil proses rekonsiliasi obat jenis DRP potensial pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Sewon II Bantul terbagi menjadi 3 yaitu:
  - a. Pada kasus interaksi obat sebanyak 31%
  - b. Pada kasus ketidakpatuhan pasien sebanyak 26%
  - c. Pada kasus ADR sebanyak 43%

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil dari proses rekonsiliasi obat, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk tenaga kesehatan khususnya tenaga kefarmasian perlu adanya perhatian kewaspadaan terhadap penggunaan obat yang berpotensi menjadi DRP
2. Untuk instansi terkait perlu adanya kerjasama antar profesi untuk saling membantu agar kesehatan pasien lebih terjamin dan perlu adanya ruangan khusus untuk melakukan wawancara mendalam

kepada pasien, agar mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait pengobatan pasien.

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu membuat pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang lebih mendalam kepada pasien terkait pengobatan agar didapatkan hasil yang lebih maksimal.