

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tempat penempatan antiseptik mempengaruhi koefisien fenol di RSUD Kota Yogyakarta.
2. Koefisien fenol antiseptik yang ditempatkan di zona risiko rendah infeksi (ruang administrasi) lebih besar dibandingkan dengan koefisien fenol antiseptik yang ditempatkan pada zona risiko sedang infeksi (bangsal penyakit tidak menular), risiko tinggi infeksi (UGD), dan risiko tertinggi infeksi (ICU).

B. Saran

Dengan mempertimbangkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu penelitian lebih lanjut dengan memperhatikan lebih seksama mengenai kemungkinan terjadinya kontaminasi ketika dilakukan pengenceran dan akan dilakukan inkubasi.
2. Perlu dilakukan penelitian dengan lokasi penempatan antiseptik lainnya.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan konsentrasi pengenceran yang berbeda.