

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan karakteristik subjek dalam penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasien tuberkulosis berjenis kelamin laki-laki dan usia terbanyak adalah kelompok usia 56-65 tahun.

1. Dari hasil uji analisis terdapat kenaikan kadar limfosit setekah terapi rutin Obat Anti Tuberkulosis dibandingkan dengan sebelum mendapatkan terapi rutin Obat Anti Tuberkulosis.
2. Dari hasil uji analisis berat badan setelah mendapat terapi rutin Obat Anti Tuberkulosis pada pasien TB didapatkan kenaikan dibandingkan sebelum mendapatkan terapi rutin Obat Anti Tuberkulosis.

Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yaitu terdapat perbedaan kadar limfosit dan berat badan sebelum dan sesudah terapi OAT pada pasien tuberkulosis.

B. Saran

1. Bagi Pasien

Diharapkan pasien untuk mematuhi pengobatan yang sedang dijalani sesuai jadwal agar tidak terjadi proses pengulangan ataupun resistensi bakteri terhadap jenis obat tertentu.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Hasil penelitian ini membuktikan adanya peningkatan terhadap kadar limfosit dan berat badan pada pasien TB. Sehingga dianjurkan bagi petugas kesehatan untuk menggalakkan mengenai pentingnya terapi rutin OAT pada pasien TB.

3. Bagi keluarga

Diharapkan peran serta anggota keluarga tetap memberikan dukungan kepada pasien TB untuk tetap minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan.

4. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat dirubah dengan menggunakan parameter lain dalam menilai perubahan yang terjadi setelah menjalani pengobatan Obat Anti Tuberkulosis, misalnya nilai monosit.