

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan pada penderita diabetes melitus tipe 2 pengguna terapi OAD dibandingkan dengan penderita diabetes melitus tipe 2 pengguna terapi insulin pada domain somatik dan domain psikologis.
2. Tidak terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan pada penderita diabetes melitus tipe 2 pengguna terapi OAD dibandingkan dengan penderita diabetes melitus tipe 2 pengguna terapi insulin pada domain sosial dan domain lingkungan.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan populasi responden yang lebih luas lagi agar dapat memberi hasil yang lebih akurat.
2. Untuk menghindari terjadinya bias disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi subjek penelitian serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang

dapat mempengaruhi kualitas hidup secara umum seperti kondisi psikososial, budaya, sosioekonomi, kesehatan, dan lain-lain.

3. Dalam melakukan pengukuran kualitas hidup dapat digunakan instrumen pengukuran kualitas hidup yang spesifik terhadap penyakit diabetes melitus tipe 2.