

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan luaran terapi OAT pada pasien TB anak diagnostik skoring dan pasien TB anak diagnostik klinis.

#### **B. Saran**

1. Rumah sakit: Melakukan pencatatan dengan lebih lengkap data-data penting dalam mengevaluasi perkembangan pasien dalam periode terapi (misalnya kelengkapan data berat badan).
2. Peneliti lain: Melakukan persiapan perizinan penelitian dengan lebih cepat dan mempersering pengambilan data dikarenakan perizinan hanya memperbolehkan pengambilan data selama 3 bulan agar ditemukan sampel yang cukup. *Cross check* variabel yang diteliti dengan data yang dicatat di rekam medis sebelum waktu penelitian agar peneliti mendapatkan variabel yang diinginkan.
3. Masyarakat: Mengenali gejala tuberkulosis pada dewasa maupun anak sesegera mungkin. Segera periksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala tuberkulosis (batuk lama, sering, berdahak pada dewasa, penurunan berat badan). Sebagai pencegahan penularan, gunakan masker dan kurangi untuk keluar rumah.