

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari catatan medis pada pasien Infark Miokard Akut yang dirawat di rumah sakit Sardjito Yogyakarta dengan periode Juli 2008 – Agustus 2009 dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang, maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa :

1. Insidensi Infark Miokard Akut 2 kali lebih banyak pada pria (66,7%) dibandingkan dengan wanita (33,3%)
2. Usia yang paling banyak menderita Infark Miokard Akut adalah usia 60 tahun keatas
3. Faktor resiko yang dapat menyebabkan Infark Miokard Akut adalah hipertensi (39,4%) dan diabetes mellitus (18,2%)
4. Keluhan nyeri dada yang dirasakan oleh penderita infark miokard akut sebanyak 60,6%
5. Sensitivitas troponin I dalam penegakkan diagnosis Infark Miokard Akut sebesar 51,5% dengan menggunakan nilai cut off point sebesar 3,25

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain :

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran spektrum klinis secara keseluruhan pada penderita infark miokard akut

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai validitas troponin I yang mencakup nilai sensitivitas dan spesifisitas serta nilai cut off point troponin I
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam penentuan nilai sensitivitas dan spesifisitas troponin I berdasarkan onset nyeri dada
4. Dalam pengambilan data diperlukan mendapat data yang lebih lengkap dalam hal anamnesa, pemeriksaan EKG, dan pemeriksaan laboratorium