

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Karakteristik jumlah pasien sepsis neonatus berdasarkan onset terjadinya infeksi didapatkan sepsis neonatus awitan dini (66,9%), sepsis awitan lambat (33,1%). Berdasarkan jenis kelamin laki-laki (58,3%), perempuan (41,7%). Berdasarkan berat badan lahir didapatkan 69 orang (67%) ≥ 2500 gram dan 34 orang (33%) < 2500 gram.
2. Pada penelitian ini rerata I/T ratio 0,16, nilai maksimal 0,47, nilai minimal 0,02 dengan standar deviasi 0,085.
3. Pada penelitian ini rerata jumlah limfosit 34,63, nilai maksimal 76, nilai minimal 9 dengan standar deviasi 15,65.
4. Hubungan antara I/T ratio dengan jumlah limfosit pada pasien dengan I/T ratio $\geq 0,2$ sebanyak 27 sampel dengan jumlah limfosit menurun sebanyak 8, jumlah limfosit normal sebanyak 19, dan jumlah meningkat sebanyak 0.
5. Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan bermakna antara I/T Ratio dengan jumlah limfosit dikarenakan $p > 0,05$ yaitu 0,188 dengan koefisien korelasi -0.131.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan beberapa kelemahan yang mungkin bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti diharapkan untuk melanjutkan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk menghindari terjadinya bias.

2. Perlu dilakukan penelitian dengan cakupan tempat yang lebih luas agar hasil penelitian lebih mudah digeneralisasikan.