

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang prevalensi, etiologi, dan gambaran radiografi diastema sentral pada mahasiswa PSPDG di UMY dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prevalensi diastema sentral pada mahasiswa PSPDG di UMY sebanyak 21 mahasiswa (5%) lebih banyak terjadi pada perempuan sebanyak 13 mahasiswa dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 8 mahasiswa.
2. Etiologi dari diastema sentral yang sering terjadi yaitu frenulum labial yang tinggi sebanyak 13 mahasiswa dengan prosentase 61,9 %. Terdapat 6 mahasiswa dengan prosentase 38,1% yang memiliki riwayat keluarga dengan diastema sentral dan terdapat 2 mahasiswa yang memiliki etiologi keduanya dengan prosentase 9,5 % di PSPDG UMY.
3. Gambaran radiografi diastema sentral yang disebabkan oleh frenulum labial yang tinggi menunjukkan adanya area radiolusen dan struktur berbentuk V atau bulatan kecil di ujung sutura maksilaris antara gigi seri sentral rahang atas.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih banyak untuk menggambarkan kondisi diastema sentral di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi mahasiswa PSPDG UMY

Peneliti menyarankan kepada mahasiswa PSPDG di UMY agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulutnya dengan melakukan perawatan ke dokter gigi.

3. Bagi masyarakat

Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar mengetahui efek samping diastema sentral yang disebabkan oleh etiologi frenulum labialis abnormal jika tidak melakukan perawatan ke dokter gigi.