

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara anemia pada ibu hamil trimester II dengan kejadian perdarahan post partum di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta dengan nilai $p = 0,010$ dan *Odds Ratio* = 4,156.
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara anemia pada ibu hamil trimester III dengan kejadian perdarahan post partum di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta dengan nilai $p = 0,119$ dan *Odds ratio* = 2,200.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai variabel pengganggu dalam penelitian ini dan membuat perbandingan agar dapat diketahui mengenai besaran resiko pada ibu hamil yang mengalami kejadian perdarahan post partum sehingga dapat menjadi acuan atau referensi pencegahan kasus perdarahan post partum.

2. Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan

Bagi tenaga medis dan kesehatan diharapkan dapat memberikan terapi yang tepat maupun melakukan pencegahan sedini mungkin pada ibu hamil dengan resiko kejadian perdarahan post partum serta sebagai upaya preventif untuk menurunkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas akibat kasus perdarahan post partum.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil akan pentingnya pencegahan pada kasus perdarahan post partum serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu yang beresiko maupun tidak dalam ketepatan terapi anemia sebagai upaya pencegahan terjadinya perdarahan post partum. Sehingga diharapkan menurunkan angka kejadian anemia maupun kejadian perdarahan post partum.