

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester II dengan kejadian bayi lahir prematur di Puskesmas Tegalsrejo Yogyakarta ($p < 0,05$) dengan *Odd Ratio* 4,644
2. Tidak terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil trimester III dengan kejadian bayi lahir premature di Puskesmas Tegalsrejo Yogyakarta ($p > 0,05$) dengan *Odd Ratio* 0,604

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai variabel pengganggu dalam penelitian ini dan membuat perbandingan agar dapat diketahui mengenai besaran faktor yang menjadi resiko pada ibu hamil yang mengalami kelahiran bayi lahir prematur sehingga dapat menjadi acuan atau referensi untuk pencegahan kasus bayi lahir prematur.

2. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dapat memberikan terapi yang tepat maupun melakukan pencegahan sedini mungkin pada Ibu hamil dengan resiko melahirkan dengan bayi lahir prematur serta sebagai upaya preventif untuk menurunkan angka kejadian morbiditas dan mortalitas akibat kasus bayi lahir prematur.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu hamil akan pentingnya pencegahan pada kasus kelahiran dengan bayi lahir prematur serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran Ibu hamil yang beresiko ataupun tidak dalam ketepatan terapi anemia sebagai upaya pencegahan terjadinya kelahiran dengan bayi lahir prematur. Sehingga diharapkan menurunkan angka kejadian anemia pada ibu hamil maupun kejadian bayi lahir prematur.