

**COMPARATION BETWEEN SUPERIMPOSED PREECLAMPSIA AND GENUINE  
PREECLAMPSIA WITH PERINATAL OUTCOMES**

**PERBANDINGAN PRE-EKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DENGAN RIWAYAT  
HIPERTENSI DAN TANPA RIWAYAT HIPERTENSI TERHADAP KEADAAN  
BAYI LAHIR**

**Gina Meidina Putri<sup>1</sup> Supriyatiningssih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2</sup>Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [gina.meidina@yahoo.com](mailto:gina.meidina@yahoo.com)

**ABSTRACT**

**Background:** *Preeclampsia is major cause of maternal mortality in developed and developing countries. It is also a major cause of perinatal morbidity and mortality. Perinatal outcome is influenced by history of hypertension in pregnancies.*

**Objective:** *To compare superimposed preeclampsia and genuine preeclampsia with perinatal outcomes.*

**Methods:** *Retrospective observational analytic with cross sectional method. The sample are pregnant women who diagnosed preeclampsia in PKU Muhammadiyah Temanggung hospital. 91 cases are collected based on medical record. The data were analyzed by Chi-Square test with the significance of  $p<0,05$ .*

**Result:** *There was a correlation between superimposed preeclampsia and genuine preeclampsia with perinatal outcomes in PKU Muhammadiyah Temanggung hospital ( $p=0,000$ ).*

**Conclusion:** *women with superimposed preeclampsia have a higher risk of adverse perinatal outcomes than genuine preeclampsia.*

**Keywords:** *Preeclampsia, Superimposed Preeclampsia, Genuine Preeclampsia, Perinatal Outcomes.*

## INTISARI

**Latar Belakang:** Preeklampsia adalah penyebab terbesar pada kematian ibu hamil di negara maju maupun negara berkembang. Dan merupakan penyebab terbanyak kecacatan dan kematian bayi lahir. Keadaan bayi lahir dipengaruhi oleh riwayat hipertensi pada kehamilan.

**Tujuan:** Menilai perbandingan hipertensi kronik pada kehamilan (*superimposed preeclampsia*) dan preeclampsia dalam kehamilan (*genuine preeclampsia*) dengan keadaan bayi lahir.

**Metode:** Restrospektif observasional analitik dengan metode *cross sectional*. Sampel penelitian adalah ibu hamil yang datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dan didiagnosa preeclampsia. Pengambilan data berdasarkan buku rekam medis dan dikategorikan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi (91 kasus). Data dianalisa dengan uji Chi-Square dengan signifikansi  $p<0,05$ .

**Hasil:** Analisis data menunjukkan adanya perbandingan antara hipertensi kronik pada kehamilan (*superimposed preeclampsia*) dan preeclampsia dalam kehamilan (*genuine preeclampsia*) dengan keadaan bayi lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung ( $p=0,000$ ).

**Kesimpulan:** Ibu hamil dengan hipertensi kronik pada kehamilan (*superimposed preeclampsia*) memiliki risiko yang lebih tinggi memiliki keadaan bayi yang lebih buruk dibandingkan pada preeklampsia dalam kehamilan (*genuine preeclampsia*).

**Kata Kunci:** Preeklampsia, Superimposed Preeklampsia, Genuine Preeklampsia, Keadaan Bayi Lahir.