

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian Perbandingan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Persalinan Spontan dengan *Sectio Caesarea* terhadap Lama Perdarahan Nifas di Rumah Sakit PKU Gamping Yogyakarta Periode 2016-2017, adalah:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah perdarahan kala III pasca persalinan spontan dengan jumlah perdarahan kala III pasca persalinan *sectio caesarea* ditunjukkan dengan nilai p sebesar 0.000. Perdarahan kala III pada persalinan *sectio caesarea* lebih banyak daripada persalinan spontan ditunjukkan dengan *mean rank* perdarahan kala III persalinan *sectio caesarea* sebesar 66.57 dan *mean rank* perdarahan kala III persalinan spontan sebesar 34.43
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah perdarahan kala IV pasca persalinan spontan dengan jumlah perdarahan kala IV pasca persalinan *sectio caesarea* ditunjukkan dengan nilai p sebesar 0.021. Perdarahan kala IV pada persalinan spontan lebih banyak daripada persalinan *sectio caesarea* ditunjukkan dengan *mean rank* perdarahan kala IV persalinan spontan sebesar 57.13 dan *mean rank* perdarahan kala IV persalinan *sectio caesarea* sebesar 43.87.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat ikut serta dalam mengobservasi pasien secara langsung tidak hanya melalui data rekam medis, sehingga dapat memantau jumlah perdarahan hingga masa nifas berakhir.
2. Menggunakan instrumen penelitian berupa timbangan elektrik untuk menimbang pembalut yang berisi darah, dan pembalut maternitas yang memiliki daya tampung 250 ml, sehingga hasil lebih akurat.
3. Melanjutkan penerapan di lapangan dan memperketat pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini karena Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta sudah melaksanakan program tersebut.
4. Perlu adanya pedoman penulisan rekam medis agar data yang dicantumkan lengkap dan jelas terbaca dengan tujuan agar mempermudah pembacaan kembali data untuk kepentingan penelitian.