

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian di Puskesmas Sewon I Bantul Gambaran Penggunaan Kortikosteroid untuk Pasien Rawat Jalan dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

Berdasarkan usia pemberian kortikosteroid yang paling banyak usia dewasa 26 – 45 tahun (55%) dan berdasarkan diagnosis pasien secara urut dari yang paling banyak ke paling sedikit kejadiannya adalah Otolgia dengan persentase 29,48%, Parotitis dengan persentase 34,98%, Otitis eksterna dengan persentase 17,35%, Alergi dengan persentase 7,51%, Batuk dengan persentase 5,49%, dan ISPA dengan persentase 0,57%. Sediaan kortikosteroid yang diberikan ada 3 jenis yaitu deksametason, betametason, dan methylprednisolon. Sediaan paling banyak diresepkan adalah deksametason dengan dosis 0,5mg untuk berbagai penyakit yang sudah dicantumkan. Selanjutnya cara pemberian kortikosterid yang paling banyak diresepkan secara oral.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

Perlu dilakukan penelitian tentang rasionalitas penggunaan kortikosteroid secara lengkap dengan menggunakan metode prospektif.