

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi sebesar 83,30%, tingkat pengetahuan sedang sebesar 14,30% dan tingkat pengetahuan rendah sebesar 2,40%.
2. Tingkat kepatuhan minum OAT pasien Tuberkulosis Paru tinggi sebesar 78,60%, tingkat kepatuhan sedang sebesar 14,30% dan tingkat kepatuhan rendah 7,10%.
3. Ada hubungan yang sangat kuat dan bermakna antara Tingkat Pengetahuan penderita tentang penyakit Tuberkulosis Paru dan kepatuhan minum OAT.

#### **B. Saran**

1. Bagi tenaga kesehatan

Memberikan informasi kepada pasien TB Paru mengenai pentingnya pengetahuan kepatuhan minum obat agar mengoptimalkan hasil terapi.

2. Peneliti Selanjutnya

- Kuesioner tingkat pengetahuan perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat mengukur pengetahuan responden terkait semua aspek TB Paru secara lengkap. Yaitu dengan memperbaiki kata-kata dalam item kuesioner yang tidak valid.
- Melihat hubungan faktor-faktor lain terhadap peningkatan kepatuhan pasien TB Paru untuk mengoptimalkan terapi TB Paru. Seperti karakteristik responden (usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pekerjaan) terhadap kepatuhan minum OAT.