

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Wates dapat disimpulkan

1. Respon terapi dari gejala stenosis yaitu 94,12%, terdiri dari 1 gejala stenosis (62,75%) dan 2 gejala stenosis (31,37%), hasil uji latihan jantung yang terdiri dari respon iskemik (+) terdapat 1 pasien (1,96%), angina (+) terdapat 16 pasien (31,37%), respon hemodinamik (+) terdapat 0 pasien (0%), aritmia (+) terdapat 3 pasien (5,88%), kelas kebugaran rendah terdapat 30 pasien (58,82%).
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap respon terapi farmakologi pasien PJK berupa *Adverse Drug Reaction* (ADR) berupa efek samping obat terdapat 10 pasien (19,61%) dan gaya hidup (*lifestyle*) berupa merokok aktif sebanyak 32 pasien (62,75%), aktifitas fisik terbanyak jalan kaki terdapat 37 pasien (72,55%), BMI berupa obesitas terdapat 23 pasien (45,10%).
3. Biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh pasien PJK pada kunjungan pertama rawat jalan saat penelitian sebesar Rp.310.000±SD Rp.20.459, sehingga memiliki interval biaya Rp. 289.541 sampai Rp. 334.059

B. SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Pihak Rumah Sakit

Rekam medik pasien sebaiknya ditulis dengan lengkap seperti hasil lab untuk membantu melihat keadaan pasien.

2. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara pasien lebih detail seperti riwayat penyakit keluarga, pola makan dll untuk mendukung analisa penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

Data yang diperoleh saat wawancara pasien kurang lengkap seperti riwayat keluarga, pola makan dll serta keterbatasan waktu peneliti dalam mengamati pasien selama menjalani terapi.