

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian gambaran perubahan gerak mandibula pada pasien RSGM UMY dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien dengan perubahan gerak mandibula berupa defleksi dan deviasi lebih banyak daripada pasien yang tidak mengalami perubahan gerak mandibula (normal) dan paling banyak pasien dengan maloklusi kelas I. Persentase pasien yang mengalami defleksi dengan maloklusi kelas I, II, dan III beturut-turut sebesar 84.2%, 5.3%, dan 10.5%, pasien yang mengalami deviasi sebesar 69.9%, 12.0%, dan 18.1%, sedangkan yang tidak mengalami perubahan gerak mandibula sebesar 69.6%, 8.7%, dan 21.7%.

B. Saran

1. Perlunya penelitian lebih mendalam mengenai faktor penyebab perubahan gerak mandibula.
2. Perlunya pembagian jumlah yang merata pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar gambaran perubahan gerak mandibula dapat terpapar dengan jelas.
3. Perlunya dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak
4. Perlunya penggunaan alat yang lebih akurat dalam mengukur perubahan gerak mandibula.