

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada perbedaan yang signifikan efektifitas memberikan parasetamol pre sirkumsisi dan ibuprofen post sirkumsisi terhadap nyeri setelah sirkumsisi.
2. Pemberian Ibuprofen pasca sirkumsisi lebih efektif mengurangi rasa nyeri setelah sirkumsisi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Saran bagi dokter

Sebaiknya dokter memberikan obat yang lebih baik dan benar terhadap anak yang habis sirkumsisi, dengan memperhitungkan efek samping dari obat.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan taraf kuantitas dan kualitasnya. Secara kuantitas, dengan memperluas daerah penelitian atau menambah jumlah responden, sedangkan secara kualitas dengan memberikan perlakuan lain yang memungkinkan lebih efektif dari kedua perlakuan pada penelitian ini.