

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan terapi kombinasi Risperidon, rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah Rp 31.191,40 ± Rp 8.545,114 dengan biaya minimal Rp 7.598,00 dan maksimal Rp 139.560,00; sedangkan pada penggunaan terapi kombinasi Haloperidol, rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah Rp 11.186,95 ± Rp 1.163,970 dengan biaya minimal Rp 3.223,00 dan maksimal Rp 18.995,00. Analisis efektivitas biaya terapi kombinasi Haloperidol lebih baik dibandingkan dengan terapi kombinasi Risperidon sesuai dengan tabel efektivitas biaya ($p = 0,005$).

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode eksperimental untuk menghindari bias dan mengontrol perlakuan yang diberikan.
2. Pada penelitian selanjutnya juga sebaiknya tidak hanya melihat dari lama fase akutnya saja dalam membandingkan kedua jenis terapi.
3. Bagi pihak RSJ, penggunaan Haloperidol bisa dipertimbangkan untuk digunakan dalam terapi fase akut pasien skizofrenia jika dilihat dari segi biaya.