

## INTISARI

**Latar Belakang :** Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sehingga belum dapat mencapai point MDG's no.5 tentang kematian maternal. Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu negara dapat diprediksi dari kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Kematian ibu akibat kehamilan, persalinan dan nifas sebenarnya sudah banyak dibahas namun hingga saat ini pemerintah masih belum mampu mempercepat penurunan AKI seperti yang diharapkan dikarenakan berbagai faktor. Hal ini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari faktor risiko kematian ibu.

**Metode :** Penelitian ini menggunakan metode *analitik deskriptif* dengan rancangan *cross sectional retrospektif*. Penelitian ini menggunakan data dari dinas kesehatan Kabupaten Bantul dan didapatkan 59 subjek penelitian kematian maternal tahun 2010-2014. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif mengenai faktor risiko terjadinya kematian maternal.

**Hasil :** Komplikasi kehamilan terdapat 69% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada yang tidak ada komplikasi kehamilan. Komplikasi persalinan terdapat 55,9% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada yang tidak ada komplikasi persalinan. Komplikasi nifas terdapat 49,2% mengalami kejadian kematian maternal lebih sedikit daripada tidak ada komplikasi nifas. Usia 20-35 tahun terdapat 57,6% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada usia >35 tahun. Paritas  $\leq 1$  terdapat 55,9% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada paritas 2-4. *Antenatal Care*  $\geq 4$  terdapat 76,3% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada *Antenatal Care*  $\leq 4$ . Keterlambatan rujukan terdapat 71,2% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada tidak terjadi keterlambatan rujukan. Pendidikan Ibu  $\geq 9$  tahun terdapat 66,1% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada pendidikan Ibu <9 tahun. Ibu yang bekerja terdapat 81,4% mengalami kejadian kematian maternal lebih banyak daripada Ibu yang tidak bekerja.

**Kesimpulan :** Faktor risiko yang terdapat dalam determinan dekat, determinan jauh dan determinan antara mempunyai andil secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dalam kejadian kematian maternal

**Kata kunci :** faktor risiko, kematian maternal, angka kematian, kematian ibu, komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, AKI Bantul

## **ABSTRACT**

**Background:** *Maternal mortality rate in Indonesia is still high so it can not achieve the MDG's point no.5 of maternal deaths. Maternal Mortality Rate (MMR) in a country can be predicted from the capacity of health personnel for early detection in pregnant women, maternity and childbirth. Maternal deaths due to pregnancy, childbirth and postpartum actually been much discussed, but until now, the government is still not able to accelerate the decline in MMR as expected due to various factors. This, encourage researchers to conduct research aimed at finding risk factors for maternal mortality.*

**Methods:** *This study used a descriptive analytic method with cross sectional retrospective. This study uses data from the health service Bantul and obtained 59 research subjects maternal deaths in 2010-2014. Then performed a descriptive analysis of the risk factors for maternal mortality.*

**Results:** *Complications of pregnancy there is a 69% incidence of maternal deaths suffered more than that there is no pregnancy complications. Childbirth complications are 55.9% incidence of maternal deaths suffered more than no delivery complications. Puerperal complications are experienced 49.2% incidence of maternal deaths less than no puerperal complications. Age 20-35 years are 57.6% incidence of maternal deaths suffered more than those aged > 35 years. Parity <1 there is a 55.9% incidence of maternal deaths suffered more than parity 2-4. Antenatal Care  $\geq 4$  contained 76.3% incidence of maternal deaths suffered more than Antenatal Care  $\leq 4$ . Delay references contained 71.2% incidence of maternal deaths suffered more than avoid delays referral. Mother education  $\geq 9$  year there were 66.1% incidence of maternal deaths suffered more than education Mother <9 years. Mothers who work are 81.4% incidence of maternal deaths suffered more than mothers who do not work.*

**Conclusions:** *The risk factors contained in the determinant near, far and determinants among determinants have contributed individually and together in the incidence of maternal deaths*

**Keywords:** *Risk factors, maternal mortality, mortality, maternal mortality, complications of pregnancy, childbirth complications, AKI BU*