

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan pasien yang mengkonsumsi obat oral kombinasi antidiabetik sebesar 28.6% .
2. Tingkat kepatuhan pasien yang menggunakan injeksi insulin sebesar 37.2%.
3. Tidak ada perbedaan yang bermakna antara tingkat kepatuhan pasien kelompok obat oral kombinasi dengan kelompok injeksi insulin ($p\text{-value} = >0,05$)
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pasien DM tipe 2 yang menggunakan obat oral kombinasi yaitu lupa mengkonsumsi obat, sengaja tidak mengkonsumsi obat dan faktor biaya sedangkan pada kelompok injeksi insulin yaitu lupa menggunakan obat, sengaja tidak menggunakan obat dan faktor sulit menggunakan obat.

B. Saran

Sebagai penutup dalam penelitian ini, penyusun dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi farmasis perlunya KIE (konseling informasi edukasi) tentang

2. Bagi pihak rumah sakit sebaiknya menyediakan media pendidikan kesehatan bagi penderita DM seperti leaflet yang dapat dimanfaatkan untuk penderita diabetes mellitus.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terapi (termasuk tingkat penghasilan pasien & jumlah obat lain yang digunakan) terhadap tingkat kepatuhan pasien DM tipe 2.