

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penambahan bubuk cangkang telur ayam ras dan bubuk cangkang telur ayam kampung mempunyai pengaruh terhadap durasi perdarahan pada ekor tikus *Rattus norvegicus*. Subyek yang diberikan bubuk cangkang telur mempunyai waktu perdarahan lebih cepat dengan durasi rata-rata 5,471 menit, bubuk cangkang telur ayam kampung 8,0960 menit dan tanpa diberikan perlakuan 12,234 menit. Penambahan subyek yang diberi bubuk cangkang telur lebih cepat durasi perdarahannya karena kalsium pada cangkang telur ayam ras lebih banyak daripada ayam kampung.

#### B. Saran

##### 1. Bagi Masyarakat

Hasil limbah dari olahan produksi makanan sebaiknya jangan langsung dibuang, akan tetapi dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan sekitar, contohnya pada cangkang telur dapat kita manfaatkan untuk kesehatan ataupun untuk hal lainnya.

##### 2. Bagi penulis lainnya

Penelitian lebih lanjut mengenai cara sediaan cangkang telur dan kandungan apa yang mempengaruhi durasi perdarahan selain kalsium pada cangkang telur.